

T-Safe spiraal als voorkeur opgenomen in Formularium Nijmegen

Formularium Nijmegen		Uitloggen			
Zaken	Inleiding en adressen	Doseringschalen	Kreatinineklaring	Toelichting recepten	Colofon
A Algemeen	W05				
B Bloed en bloedvormende organen	Misselijkheid / braken in zwangerschap				
D Spijverteringsorganen	W10.1				
F Oog	Morning after pill				
H Oor	W11				
K Hart vaatstelsel	Anticonceptie; orale anticonceptie				
L Bewegingsapparaat	W12				
N Zenuwstelsel	IUD				
P Psychische problemen	W14				
R Luchtwegen	Andere anticonceptie vrouw				
S Huid en subcutis	W14.2				
T Endocriene klieren / Metabolisme	Prikpil				
U Urinewegen	W17				
W Zwangerschap / anticonceptie	Hevig bloedverlies post partum				
X Geslachtsorganen vrouw	W70.1				
Y Geslachtsorganen man	Endometritis puerperalis				
	W94				
	Mastitis puerperalis				
	W95.1				
	Lactatieremming				
	W95.2				
	Tepelkloven				

W12 IUD

T-safe Cu380A®

G02BA02

vorm
dosis

iud met 380mm2 koper
ledere 10 jaar vervangen. Binnen 5 dagen
post coitum inbrengen bij toepassing als
morning after spiraal.

opmerking

Niet binnen 6 weken postpartum plaatsen.

T-Safe®